

第3類医薬品

◆ウチダの和漢生薬◆

ウチダの **せんぶり末**

日本薬局方 センブリ末



使用上の注意



相談すること

健胃の目的で用いる場合

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

止瀉の目的で用いる場合

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)
 - (4) 高齢者。
2. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141

受付時間 9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

効能・効果

健胃の目的で用いる場合

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

止瀉の目的で用いる場合

下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便

用法・用量

健胃の目的で用いる場合

次の1回量を1日3回、食前または食間に服用する。

年 齢	1 回 量
大人 (15 歳以上)	0.015g
15 歳未満	服用しないこと

止瀉の目的で用いる場合

次の1回量を1日3回を限度とし服用する。

服用間隔は4時間以上おくこと。

年 齢	1 回 量
大人 (15 歳以上)	0.3g
15 歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- ・健胃の場合は1回量は添付の小サジ約1杯、
止瀉の場合は1回量は添付の大サジ約1杯です。
- ・定められた用法・用量を厳守すること。

成分・分量

1日量 (0.9g) 中

日本薬局方センブリ末 0.9g

MMK



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-4-10