

ウチダのせんぶり末 500g



第3類医薬品 ウチダのせんぶり末 MMK

用法・用量 日本薬局方センブリ末

健胃の目的で用いる場合
大人（15歳以上）は1回量0.015g、1日3回、食前または食間に服用する。

止瀉の目的で用いる場合
大人（15歳以上）は1回量0.3g、1日3回を限度とし服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。

用法・用量に関連する注意

- ・健胃の場合は1回量は添付の小サジ約1杯、止瀉の場合は1回量は添付の大サジ約1杯です。
- ・定められた用法・用量を厳守すること。

効能・効果

健胃の目的で用いる場合 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

止瀉の目的で用いる場合 下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便

⚠ 使用上の注意

🗉 相談すること

健胃の目的で用いる場合

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人。
2. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

止瀉の目的で用いる場合

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
(本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)
- (4) 高齢者。
2. 5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること


保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問合せ先
株式会社ウチダ和漢薬 電話 03-3806-4141
受付時間 9:00～17:30（土、祝日を除く）

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

 スプーン線：PE



第3類医薬品 **ウチダのせんぶり末 6g** MAYC
 日本薬局方センブリ末

用法・用量
 健胃の目的で用いる場合 大人（15歳以上）は1回量0.015g、1日3回、食前または食間に服用する。
 止瀉の目的で用いる場合 大人（15歳以上）は1回量0.3g、1日3回を限度とし服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。

用法・用量に関連する注意
 ・健胃の場合は1回量は添付の小サジ約1杯、止瀉の場合は1回量は添付の大サジ約1杯です。
 ・定められた用法・用量を厳守すること。

効能・効果
 健胃の目的で用いる場合 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき
 止瀉の目的で用いる場合 下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便

使用上の注意
相談すること

健胃の目的で用いる場合
 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 医師の治療を受けている人。
 2. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

止瀉の目的で用いる場合
 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
 (本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがある。)
 (4) 高齢者。
 2. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意
 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

●お問合せ先
 株式会社ウチダ和漢薬 電話 03-3806-4141
 受付時間 9:00～17:30 (土、日、祝日を除く)

副作用報告制度
 電話 0120-148-931

スプーン袋: PE
 内 袋: PP