

第2類医薬品

ウチダの和漢生薬

ウチダの 黄柏末

日本薬局方 オウバク末



使用上の注意



相談すること

内用

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 発熱を伴う下痢のある人、高齢者。
 - 血便のある人、粘液便の続く人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 1週間位服用しても症状がよくならない場合

外用

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
 - 切傷等の外傷のある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合
 - 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

効能・効果

- （内用）胃弱，食欲不振，胃部・腹部膨満感，消化不良，食べ過ぎ，飲み過ぎ，胃のむかつき，下痢
（外用）うちみ，ねんざ

用法・用量

（内用）

次の1回量を1日3回，食前または食間に服用する。

年 齢	1 回 量
大人（15歳以上）	1g
15歳未満	服用しないこと

（外用）

外用は水で練って貼る。

用法・用量に関連する注意

1回量は添付のサジ約3杯です。

内用．定められた用法・用量を厳守すること．

外用．（1）定められた用法・用量を厳守すること．

（2）小児に使用させる場合には，保護者の指導監督のもとに使用させること．

（3）目に入らないように注意すること．万一，目に入った場合には，すぐ水又はぬるま湯で洗うこと．なお，症状が重い場合には，眼科医の診療を受けること．

成分・分量

1日量（3g）中

日本薬局方オウバク末 3g

VTG



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都中央区日本橋本町 4-2-8