

第3類医薬品

ウチダの和漢生薬

ウチダの 黄柏末

日本薬局方 オウバク末



使用上の注意



相談すること

内用

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 発熱を伴う下痢のある人、高齢者。
 - 血便のある人、粘液便の続く人。
- 1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

外用

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - 切傷等の外傷のある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

株式会社 ウチダ和漢薬 03-3806-4141
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

効能・効果

- (内用) 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢
(外用) うちみ、ねんざ

用法・用量

(内用)

次の1回量を1日3回、食前または食間に服用する。

年齢	1回量
大人(15歳以上)	1g
15歳未満	服用しないこと

(外用)

外用は水で練って貼る。

用法・用量に関連する注意

1回量は添付のサジ約3杯です。

内用・定められた用法・用量を厳守すること。

外用・(1)定められた用法・用量を厳守すること。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。

成分・分量

1日量(3g)中

日本薬局方オウバク末 3g

MNB



株式会社 ウチダ和漢薬

東京都荒川区東日暮里 4-4-10