

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

第3類医薬品

日本薬局方

オウバク末<内用>

オウバク末は、ミカン科の落葉高木キハダのコルク皮を除いた樹皮を乾燥、粉末にしたものです。

⚠ 使用上の注意



【相談すること】

- 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人または粘液便の続く人。
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状あらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1カ月位(食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5~6回、下痢に服用する場合は5~6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢

用法・用量

次の量を食前または食間に服用して下さい。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1g	3回
15才未満	服用しないで下さい	

※添付さじ 1杯 1g

成分・分量

1日量(3.0g)中 日本薬局方 オウバク末 3g

保管および取扱上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる)

※ 本品は生薬の粉末ですので、製品により粉末の色調が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

製造販売元:株式会社 延寿堂(えんじゅどう)

〒930-0813 富山県富山市下赤江町1-13-3

電話:076-431-7017 FAX:076-431-7013

受付時間:午前9:00から午後4:30まで(土、日、祝日を除く)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

第3類医薬品

日本薬局方

オウバク末<外用>

オウバク末は、ミカン科の落葉高木キハダの科尔ク皮を除いた樹皮を乾燥、粉末にしたものです。

使用上の注意



【してはいけないこと】

(守らないと、現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 眼の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。



【相談すること】

1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状あらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

うちみ、ねんざ

用法・用量

水で練って貼る。

用法及び容量に関連する注意

- (1) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けること。
- (2) 外用にのみ使用すること。

成分・分量

1日量(3.0g)中 日本薬局方 オウバク末 3g

保管および取扱上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる)

※ 本品は生薬の粉末ですので、製品により粉末の色調が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

お客様相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。

製造販売元：株式会社 延寿堂(えんじゅどう)

〒930-0813 富山県富山市下赤江町1-13-3

電話：076-431-7017 FAX：076-431-7013

受付時間：午前9：00から午後4：30まで(土、日、祝日を除く)