




なまはた印



大晃生薬有限公司

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

【用法及び用量】

〔内用〕大人（15歳以上）は1回量1g、1日3回、食前または食間に服用する。

（食間とは…食後2～3時間を指します。）

〔外用〕水で練って貼る。

【効能又は効果】

〔内用〕胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢

〔外用〕うちみ、ねんざ

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

第2類医薬品 日本薬局方

オウバク末

内容量 500g

Lot.



4 987716 119157

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：フリーダイヤル 0120-149-931

保管及び取扱い上の注意

- (1) 本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

【内用の場合】

- (1) 医師の治療を受けている人
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
(3) 高齢者

【外用の場合】

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

【内用の場合】

- 1 カ月位（止瀉で服用の場合は5～6日）服用しても症状がよくならない場合

【外用の場合】

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になります。）
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。