




なす花印



大晃生薬有限公司

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

【用法及び用量】

〔内用〕 大人（15歳以上）は1回量1g、1日3回、食前または食間に服用する。

（食間とは…食後2～3時間を指します。）

〔外用〕 水で練って貼る。

【効能又は効果】

〔内用〕 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢

〔外用〕 うちみ、ねんざ



内袋: PE

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

第3類医薬品

日本薬局方

オウバク末

内容量 500g

Lot.



4 987716 119157

保管及び取扱い上の注意

- (1)本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

大晃生薬有限会社 試験室

電話：フリーダイヤル 0120-335064

受付時間：9時～12時、13時～17時

(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：フリーダイヤル 0120-149-931

H



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【内用の場合】

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
- (3)高齢者

【外用の場合】

- (1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 内用(下痢以外)では1ヵ月位、下痢で服用又は外用では5～6日間使用しても症状が良くならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります。)
- (4)開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。