

大晃生薬有限会社

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

【用法及び用量】大人（15歳以上）は1回量0.5g、
1日3回、食前または食間に服用する。
（食間とは…食後2～3時間を指します。）

【効能又は効果】胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消
化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむか
つき、下痢

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

日本薬局方

医薬品

オ ウ レ ン 末

COPTIDIS RHIZOMA PULVERATUM

内容量 500g

LOT. No



4 987716 119355

POWDE

保管及び取扱い上の注意

- (1)本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。



使用上の注意

E

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
 - (3) 高齢者
2. 次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - 1ヵ月位（止瀉で服用の場合は5～6日）服用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になります。）
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。