

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃もたれ、食べすぎに効く
弱った胃を粘液のベールで整える胃ぐすり——— 医薬品

セルベール®


Selbelle®

For Stomach Heaviness, Heartburn, Overeating

特徴

健康な胃は、食物を消化する「胃酸」と胃酸から胃粘膜を守る「胃粘液」の量のバランスが保たれています。しかし、加齢、体調、食生活などの影響を受けて弱った胃では、粘液量が減少していることがあるため、胃もたれなどを自覚するようになります。

セルベールは、胃粘液の分泌を活発にして胃粘膜を守り、さらに胃運動を高めて胃もたれ、胸やけなどの症状を改善します。気になる胃が楽になってきます。



〈セルベールは、サッと溶けて飲みやすい細粒です。〉



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 肝臓病の人
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ
消 化 器	腹部膨満感、はきけ、腹痛
精神神経系	頭痛
その他	皮下出血

- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合

3. まれに全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）などがあらわれます。このような症状がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、下痢、口のかわき

（裏面へつづく）

効能・効果

胃もたれ、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、食欲不振、胃部・腹部膨満感、はきけ(むかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胸つかえ

用法・用量

次の量を食後に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
小児(15歳未満)	服用しないこと	

成分と働き

成人 1 日量 3 包(3g)中に次の成分を含みます。

成 分	含 量	働 き
テブレノン	112.5mg	胃の粘液量を増大させ、胃粘膜を守ります
ソウジュツ乾燥エキス (原生薬としてソウジュツ)	150mg (1.5g)	胃の働きを高め、胃もたれなどの自覚症状を緩和します
コウボク乾燥エキス (原生薬としてコウボク)	83.4mg (1.0g)	

- (1)添加物として、タルク、乳糖、バニリン、ビタミンE、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、l-メントール、香料、ケイヒ、二酸化ケイ素、ハッカ油を含有します。
- (2)本剤は淡茶色の細粒剤です。有効成分に生薬を配合しているため、細粒の中に茶褐色の粒が混入している場合がありますが、効果には変わりありません。


ひとくちメモ

胃の粘液とテブレノン

胃では、肉や魚などのタンパク質を消化するために強力な胃酸が分泌されています。胃自身もタンパク質でできているのに消化されないのは、胃粘膜の表面が粘液のベールで守られているからです。テブレノンは、粘液の分泌を活発にして粘液量を増大させる働きがある成分です。加齢、体調、食生活の影響を受けて減少してしまった胃内の粘液量を増やし、胃酸などから胃を守ります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。また、他の薬剤等を混ぜないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



包装

セルベール 12包・27包

本品についてのお問い合わせ先

●お買い求めのお店

●エーザイ「お客様ホットライン室」(フリーダイヤル ☎0120-161-454)

受付時間 平日 9:00~18:00(土、日、祝日 9:00~17:00)

ホームページ「胃のサイエンス」では胃の健康に関する情報をお届けしています。

<http://www.i-no-science.com>



エーザイ株式会社

東京都文京区小石川4-6-10