

日本薬局方

第3類医薬品

【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止しこの製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位：皮膚	症状：発疹・発赤、かゆみ
---------	--------------

- 1カ月位(食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、
食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

【成分・分量】

1日量(1.5g)中 日本薬局方 センブリ 1.5g

センブリ

【用法・用量】

年齢	1日量
大人 (15歳以上)	本品1.5gを、水約300mLで約半量になるまで煮詰め、滓を取り去り、食前または食間3回に分服、あるいは熱湯中に浸して振り出し、その抽出液を服用する。
15歳未満	服用しないこと

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる)

※浸煎剤は腐敗を防ぐため冷所に保存してください。

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

お客さま相談窓口

本製品内容についてのお問い合わせは、下記にお願い申し上げます。
電話：(076)431-7017 FAX：(076)431-7013
受付時間：午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 (株)延寿堂

〒930-0813 富山市下赤江町1-13-3