



花印



大晃生薬有限公司

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

【用法及び用量】

〔健胃の目的で用いる場合〕大人（15歳以上）は1回量  
0.015g、1日3回、食前または食間に服用する。  
（食間とは…食後2～3時間を指します。）

〔止瀉の目的で用いる場合〕大人（15歳以上）は1回量  
0.3g、1日3回を限度とし服用する。服用間隔は4  
時間以上おくこと。

【効能又は効果】

〔健胃の目的で用いる場合〕胃弱、食欲不振、胃部・腹部  
膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき  
〔止瀉の目的で用いる場合〕下痢、消化不良による下痢、  
くだり腹、軟便

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

第3類医薬品 日本薬局方

セ ン ブ リ 末

内容量 500g

Lot.



4 987716 137359

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話：フリーダイヤル 0120-149-931

保管及び取扱い上の注意

- (1) 本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。

# POWDER

⚠ 使用上の注意 E

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
  - (3) 高齢者
2. 次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
  - 1ヵ月位（止瀉で服用の場合は5～6日）服用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になります。）
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。