



千種松軒



大晃生薬有限公司

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

【用法及び用量】

〔健胃の目的で用いる場合〕大人（15歳以上）は1回量
0.015g、1日3回、食前または食間に服用する。
（食間とは…食後2～3時間を指します。）

〔止瀉の目的で用いる場合〕大人（15歳以上）は1回量
0.3g、1日3回を限度とし服用する。服用間隔は4
時間以上おくこと。

【効能又は効果】

〔健胃の目的で用いる場合〕胃弱、食欲不振、胃部・腹部
膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき
〔止瀉の目的で用いる場合〕下痢、消化不良による下痢、
くだり腹、軟便



内袋:PE,PET

(裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。)

第3類医薬品

日本薬局方

センブリ末

内容量 500g

Lot.



4 987716 137359

POWDER

保管及び取扱い上の注意

- (1)本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

大晃生薬有限会社 試験室

電話：フリーダイヤル 0120-335064

受付時間：9時～12時,13時～17時

(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話：フリーダイヤル 0120-149-931



使用上の注意

10

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
- (4) 高齢者
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位(食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回、下痢に服用する場合は5～6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。