

トチモトの オウバク末P

第3類医薬品

《日本薬局方オウバク末》

第3類医薬品

トチモトの オウバク末P

内容量 500g

【使用上の注意】 裏面をよくお読みください。

【成分及び分量又は本質】 1日量(3g)中 日本薬局方オウバク末3g

【効能又は効果】

(内用)胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、
飲み過ぎ、胃のむかつき、下痢

(外用)うちみ、ねんざ

【用法及び用量】 大人(15歳以上)は1回量1g、1日3回、食前
または食間に服用してください。外用は水で練って貼ってください。

(添付のさじ4杯約1g)

- ・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。
- ・外用でお使いの場合

(1)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、
すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、
眼科医の診療を受けてください。(2)外用にのみ使用してください。



副作用被害救済制度

0120-149-931

【使用上の注意】

相談すること (内用)

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(4) 高齢者。(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ひふ)	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位(食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつきに服用する場合は5～6回、下痢に服用する場合は5～6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

してはいけないこと (外用)

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ひふ)	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

製造番号

使用期限

[脱酸素剤入]

株式会社 **橋本天海堂**

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730