

日本薬局方

センドブリ末



4 993512 241336

500 g

第3類医薬品

LOT

506608 p



日本薬局方 センブリ末

《用法及び用量》

- (健胃の目的で用いる場合) 大人(15歳以上)は1回量0.015g、1日3回、食前または食間に服用する。
(止瀉の目的で用いる場合) 大人(15歳以上)は1回量0.3g、1日3回を限度とし服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。

《効能又は効果》

- (健胃の目的で用いる場合) 胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき
(止瀉の目的で用いる場合) 下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便
(添付サジースプーン 約0.5g)



4 993512 241336

LOT 506608 p

500 g

第3類医薬品

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

株式
会社

小島漢方

大阪市中央区常盤町2-2-19

TEL 06-6941-1643

使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は
服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください。

☐ 保管及び取扱い上の注意 ☐

- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
- 本品は天産品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。
保管には十分ご注意ください。
- 誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れ変えないで下さい。→ 替
- 本品には品質保持(カビ・虫害防止)のため季節により脱酸素剤を入れる事があります。
開封後は高温多湿を避け、なるべくお早めにご使用下さい。
- 脱酸素剤はお召し上がりなきようお願い致します。



内袋:PE/PA