

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

飲みすぎ・胃弱・食欲減退に

第2類医薬品

フクナガ 生薬胃腸薬

—10種の生薬が弱った胃腸の働きを助ける—

製品の特徴

フクナガ生薬胃腸薬は、

- 芳香や苦味を有する8種類の健胃生薬に加えて、胃酸による刺激を緩和する(制酸作用)ボレイ末、荒れた胃の粘膜の修復を助ける(胃粘膜修復作用)カンゾウ末を配合した胃腸薬です。
- 水分のとりすぎや食べすぎなどで、胃腸の消化・運動機能が弱り、胸がつかえたり、胃もたれや食欲不振などを感じる方におすすめします。
- 爽やかな香りの散剤で、携帯しやすいスティック包装です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

飲みすぎ、胃弱、食欲減退、胃もたれ、食べすぎ、消化不良、胸つかえ、胃部・腹部膨満感、胸やけ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

用法・用量

1回下記量を食後に水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人(15才以上)	1 包	3 回
11才以上15才未満	2 / 3 包	
8才以上11才未満	1 / 2 包	
5才以上8才未満	1 / 3 包	
5才未満	服用させないでください	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分とはたらき

成 分	分 量 (3包(4,500mg)中)	は た ら き
ソウジュツ(蒼朮)末	600mg	ホソバオケラなどの根茎の粉末で、健胃作用があります。
コウボク(厚朴)末	450mg	ハウノキなどの樹皮の粉末で、健胃作用があります。
チンピ(陳皮)末	450mg	ウンシュウミカンなどの成熟した果皮の粉末で、健胃作用があります。
ショウキョウ(生姜)末	105mg	ショウガの根茎の粉末で、健胃作用があります。
カンゾウ(甘草)末	150mg	ウラルカンゾウなどの根及びストロン(走茎)の粉末で、特有の甘味があり、荒れた胃の粘膜の修復を助けます。

(裏面へ続く)

成 分	分 量 (3包(4,500mg)中)	は た ら き
シュクシャ(縮砂)末	70mg	シュクシャの種子塊の粉末で、健胃作用があります。
ゴシュユ(呉茱萸)末	90mg	ゴシュユなどの果実の粉末で、健胃作用があります。
キジツ(枳実)末	60mg	ダイダイ又はナツミカンの未熟果実の粉末で、健胃作用があります。
ボレイ(牡蠣)末	1,000mg	カキの貝殻の粉末で、胃酸を中和し刺激を緩和する作用があります。
ケイヒ(桂皮)末	300mg	ケイの樹皮又は周皮の一部を除いたものの粉末で、健胃作用があります。

添加物として、ℓ-メントール、デキストリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。

●ワンポイント情報

私たちは日常、食生活の不摂生やストレスなどの結果として、胃腸の不快感を感じる場合があります。

しかし、同じ症状、例えば、もたれやむかつきなどを感じた時でも、体の状態により適した胃腸薬は異なる場合があります。

消化液(胃酸など)の分泌は過剰か、あるいは不足みか、胃腸の運動機能は活発か、あるいは衰えている感じが、などは状態の違いの一例です。

配合されている成分の働きを知って、自分の症状に適した胃腸薬を選択すれば効果的に症状の改善ができます。

ご自分にあった胃腸薬がよくわからないという方は、薬剤師など専門家にご相談の上、お選びになることをおすすめします。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 東京支社 お客様相談室
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2丁目5-1

(03)3293-3363 (ダイヤルイン)

(月～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 但し祝日を除く)



製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624

本社：大阪市淀川区宮原4丁目5-36

http://www.wakunaga.co.jp/