

△ 使用上の注意 **■ 相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人、(2) 高齢者、(3) 次の症状のある人、むくみ(4) 次の診断を受けた人、高血圧、腎臓病、心臓病
2. 服用後、まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師の診療を受けてください。[偽アルドステロン症、ミオパチー] 手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
3. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します)。

お問合せ先

日邦薬品工業株式会社

お客様相談室：☎03(3370)7174(代)

使用期限

二日酔いのむかつき

食べ過ぎ、胃のもたれ

大草胃腸薬 内服液30

第2類
医薬品

30mL



発売元
日邦薬品工業株式会社
東京都渋谷区代々木3-46-16



製造販売元
大草薬品株式会社
神奈川県横須賀市森崎1-17-15

胃腸薬 大草胃腸薬内服液30

【効能】

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐

【用法・用量】

成人(15歳以上)…1回1本(30mL)
1日2回、食前又は食間に服用してください。

服用間隔は4時間以上おいてください。
(用法・用量に関連する注意)(1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は小児(15歳未満)には服用させないでください。(3)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、効果に変わりはありません。よく振ってから服用してください。

【成分・分量】

1日量60mL(30mL×2本)中
 オウゴンエキス……………90.0mg
 オウレン流エキス……………0.6mL
 ケイヒ流エキス……………0.6mL
 生姜流エキス……………0.6mL
 蒼朮流エキス……………0.6mL
 チンピエキス……………300.0mg
 人參流エキス……………0.6mL
 カンゾウエキス……………360.0mg
 添加物としてβ-メントール、エタノール、パラベン、安息香酸Na、プロピレングリコール、白糖、ハチミツを含有します。

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

ガラス:瓶 金属:キャップ

