

ウチダのげんのしょうこTU 200g

第3類医薬品

MTL

ウチダのげんのしょうこTU 200g

日本薬局方ゲンノショウコ 日本産 寸

用法・用量 大人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること。

効能・効果 整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘

使用上の注意

ロット: 0002965

相談すること

使用期限: 0000.00



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人
- 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

※本品には、品質保持(カビ・虫害等防止)のために脱酸素剤が入っています。

脱酸素剤封入

発売元

株式会社ウチダ和漢薬
東京都荒川区東日暮里4-3-3

<お問合せ先>お客様相談センター

電話番号 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元

鶴居薬品工業株式会社
富山県南砺市野尻457-1

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

ゲンノショウコ



製品情報はこちら

ウチダのげんのしょうこTU 500g 刻

第3類医薬品

MTL

ウチダのげんのしょうこTU 500g

日本薬局方ゲンノショウコ 日本産 刻

用法・用量 大人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること。

効能・効果 整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘

使用上の注意

保管及び取扱い上の注意

相談すること

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

※本品には、品質保持(カビ・虫害等防止)のために脱酸素剤が入っています。

ロット 0002963

使用期限 0000.00

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



製品情報は
こちら

脱酸素剤封入

発売元

株式会社ウチダ和漢薬
東京都荒川区東日暮里4-3-3

<お問合せ先>お客様相談センター

電話番号 03-3806-4141

受付時間 9:00~17:30

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

鶴居薬品工業株式会社
富山県南砺市野尻457-1

ゲンノショウコ

ウチダのげんのしょうこTU 500g 寸

第3類医薬品

MTL

ウチダの げんのしょうこTU 500g

日本薬局方ゲンノショウコ 日本産 寸

用法・用量 大人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

用法・用量に関連する注意 定められた用法・用量を厳守すること。

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

効能・効果 整腸(便通を整える)、腹部膨満感、軟便、便秘

⚠ 使用上の注意

保管及び取扱い上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
医師の治療を受けている人
- 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

※本品には、品質保持(カビ・虫害等防止)のために脱酸素剤が入っています。



製品情報
はこちら



4 987359 650079

ロット
0002955

使用期限
0000.00

脱酸素剤封入

発売元

株式会社ウチダ和漢薬
東京都荒川区東日暮里4-3-3

<お問い合わせ先> お客様相談センター
電話番号 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30
(土、日、祝日を除く)

製造販売元

鶴居薬品工業株式会社
富山県南砺市野尻457-1

ゲンノショウコ