

指定医薬部外品

生菌整腸剤

販売名: **ビオスリー[®]H****36包**
(1g×36)

【使用上の注意】 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、服用を中止し、この箱を持って医師又は
薬剤師にご相談ください。
1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

効能 整腸(便通を整える)、便秘、軟便、腹部膨満感**用法・用量** 次の量を、食後に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1 包	3 回
3ヵ月以上15歳未満	1/2 包	
3ヵ月未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 用法・用量を厳守してください。



押しあける

外箱が開いていたり、中の包装が
破れている等、開封された形跡が
ある場合は使用しないでください

成分 3包中

酪酸菌	150mg
ラクトミン(乳酸菌)	30mg
糖化菌	150mg

添加物: ポリビニルアルコール(完全けん化物)、
ポビドン、乳糖水和物、パレインソデンプン

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に
保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本製品は添付文書が添付されておりませんの
で、この箱をお薬とともに保管し、服用に際して
必ずお読みください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の
原因や品質が変わるおそれがあります。)
- (5) 分包の1包を分割して服用した残りは、袋の口を
折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6) 使用期限のすぎた製品は服用しないでください。

便通が乱れる理由

大腸のバリア機能の一つに、大腸の粘液産生があり
ます。この粘液は、大腸や便をコーティングし、便が
直接大腸の壁に触れないようにすることで、有害な
菌や物質から守っています。
また、粘液は潤滑油のように便をスムーズに移動さ
せるなど、日ごろのお通じを促します。
粘液産生の低下と腸内フローラの乱れはお互いに影
響し、便秘・軟便などの便通の乱れにつながります。

**ビオスリーの働き**

ビオスリーは腸内フローラと大腸のバリア機能を
改善し、日ごろの便通を整えます。

酪酸菌… 腸内フローラを改善するとともに大腸の
バリア機能に必要な粘液の分泌を促すと
されている酪酸を産生します。

乳酸菌… 乳酸を産生して腸内フローラを改善すると
ともに、酪酸菌の増殖を助けます。

糖化菌… 腸内有用菌である乳酸菌やビフィズ菌を
増やします。

ビオスリー[®]H**36包**
[12日分]

腸内フローラと
大腸のバリア機能を改善し
日ごろの便通を整える

指定医薬部外品

整腸・便秘・軟便

ビオスリー[®]H**36包**
[12日分]

酪酸菌 乳酸菌 糖化菌

腸内フローラと
大腸のバリア機能を改善し
日ごろの便通を整える

指定医薬部外品 整腸・便秘・軟便

散 剤

製造販売元 **東亜薬品工業株式会社**
東京都渋谷区世塚2丁目1番11号提携 **東亜新薬株式会社**
東京都新宿区西新宿3丁目2番11号販売元 **アリナミン製薬株式会社**
大阪市中央区道修町四丁目1番1号お客様相談室 0120-567-087
9:00～17:00(土、日、祝日を除く)使用
期限
製造
番号

4 987910 710600

