

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

胃腸薬

イソ錠[®]

胆汁は肝臓で合成され、胆のうに貯蔵されてから十二指腸に分泌されます。
この胆汁は、腸内で脂肪の吸収や、腸の蠕動運動^{ぜんどう}、体内の老廃物の排出などを助けます。
イソ錠は胆汁の分泌を促す成分をはじめ、胃腸のはたらきを助ける成分を配合した健胃薬です。

⚠ 《使用上の注意》



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
(1) 医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 2週間位服用しても症状がよくなる場合。

効能又は効果

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化促進、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐

用法及び用量

下記の量を1日3回食後服用して下さい。

年 齢	1 回 量
15才以上	6 錠
11才以上 15才未満	4 錠
8才以上 11才未満	3 錠
5才以上 8才未満	2 錠
5才未満	服用しないこと

（用法・用量に関連する注意）

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (2) 用法・用量を厳守して下さい。

成分及び分量

6錠中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量	はたらき
胆汁末	130mg	胃腸のはたらきをよくします。
デヒドロコール酸	60mg	胆汁の分泌を促進し消化を助けたり、胃腸の不快な症状を改善します。
センブリ末	15mg	苦味健胃薬として使用される生薬です。
合成ケイ酸アルミニウム	200mg	(賦形剤)

添加物として、乳糖、バレイシヨデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、ℓ-メントールを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

(ビン入り)

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

(分包品)

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 1シート(6錠)を分割して服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、なるべく2日以内に服用して下さい。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



発 売 元 **ゼネル** 薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元 **ゼネル** 薬工伊都株式会社 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1