

食べすぎ、飲みすぎ、むかつきに

ZENEL 胃腸薬 (胆汁製剤)

第3類医薬品

イソロ[®]錠 144錠

効能又は効果

食欲不振(食欲減退)、胃部・腹部膨満感、消化促進、消化不良、胃弱、食べ過ぎ(過食)、飲み過ぎ(過飲)、胸やけ、もたれ(胃もたれ)、胸つかえ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐



成分及び分量 (6錠中)

成 分	分 量	はたらき
胆汁末	130mg	胃腸のはたらきをよくします
デヒドロコール酸	60mg	胆汁の分泌を促進し、消化を助けたり 胃腸の不快感を改善します
センブリ末	15mg	苦味健胃薬として使用される生薬です

添加物として、乳糖、バレイシヨデンプン、ゲイ酸Al、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、 ℓ -メントールを含有します

用法及び用量 (1回量)

1日3回食後服用して下さい

15才以上..... 6錠 11才以上15才未満..... 4錠

8才以上11才未満..... 3錠 5才以上 8才未満..... 2錠

5才未満..... 服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)

(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

(2)用法・用量をお守り下さい。

服用に際して、この説明文を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。



＜使用上の注意＞



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

2. 2週間位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

保管及び 取り扱い上の 注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。

(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)

(4)1シート(6錠)を分割して服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、なるべく
2日以内に服用して下さい。

(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



発 売 元 **ゼネル** 薬品工業株式会社

大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 **ゼネル** 薬工伊都株式会社

和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東15-1

製造番号

使用期限



胆汁は肝臓で合成され、胆のうに貯蔵されてから十二指腸に分泌されます。この胆汁は、腸内で脂肪の吸収や、腸の蠕動運動^{ぜんどう}、体内の老廃物の排出などを助けます。イソ口錠は胆汁の分泌を促す成分をはじめ、胃腸のはたらきを助ける成分を配合した健胃・消化薬です。