

この説明書は、本剤とともに保管し、
服用の際には、必ずお読みください。 J

胃腸薬

胃痛・胃もたれ・胸やけ 出すぎる胃酸をコントロール
塩酸ピレンゼピン配合 胃液分泌抑制型胃腸薬

ガストール細粒

GASTOL FINE GRANULES

胃痛や胸やけといった症状は、ストレスやアルコールなどの刺激で、胃酸が過剰に分泌されたときに起こります。ガストール細粒は、出すぎる胃酸を抑えて効く、胃腸薬です。

ガストール細粒を服用すると…

はじめに 出すぎる胃酸をすみやかに中和し、胃粘膜を保護します。
次に 出すぎる胃酸の分泌を抑え、胃痛や胸やけなどにすぐれた効果をあらわします。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください
(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(2) 透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
4. 長期連用しないでください

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 授乳中の人。(3) 高齢者。(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。 排尿困難 (7) 次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はきけ、胃部膨満感
その他	排尿困難、動悸、目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、下痢、口のかわき

Ⓜ 登録商標

■ 効能・効果

- 胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ
- 胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感
- はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ
- 食べすぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振



■ 用法・用量

次の1回量を1日3回、毎食後に服用します。

年 齢	大人(15才以上)	15才未満
1回量	1包	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意> ○用法・用量を厳守してください。

■ 成分と作用 3包(1日量)中

● 塩酸ピレンゼピン 45mg

出すぎる胃酸の分泌を抑えます。

● 炭酸水素ナトリウム 1,200mg

胃酸をすみやかに中和します。

● メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム900mg

胃酸を中和するとともに胃粘膜を保護します。

● ビオチン 30mg

食物の消化を促します。

添加物として、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mg、
D-メントールを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒107-8589 東京都港区赤坂4-2-6

http://www.ssp.co.jp/



Boehringer 提携

Ingelheim 日本ベリンガーインゲルハイム株式会社

9-5A0