

ガストール[®]細粒

胃腸薬 M1ブロッカー配合

- 胃酸は食物の消化に必要なものですが、ストレスや飲み過ぎなどにより必要以上に分泌されると、胃粘膜を攻撃し、胃痛・胸やけ・むかつき・胃もたれなどのつらい胃の症状を引き起こします。
- ガストール細粒は、M1ブロッカーと制酸剤を配合。制酸剤が過過ぎてしまった胃酸を中和、そして、M1ブロッカーが過剰な胃酸分泌を抑制することで、つらい胃の症状に優れた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。）

- ① 次の方は服用しないでください
(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(2) 透析療法を受けている人。
- ② 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
- ③ 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
- ④ 長期連用しないでください



相談すること

- ① 次の方は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 授乳中の人。
(3) 高齢者。
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。 排尿困難
(7) 次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病
- ② 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。



関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はきけ、胃部膨満感
その他	排尿困難、動悸、目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合。
- ③ 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、下痢、口のかわり

効能・効果

- 胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ
- 胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感
- はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲みすぎ
- 食べすぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振

用法・用量

次の1回量を1日3回、毎食後に服用します。

年 齢	成 人（15才以上）	15才未満
1回量	1包	✕服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。


成分と作用 3包（1日量）中

成 分	3包中	作 用
ピレンゼピン塩酸塩水和物 <M ₁ ブロッカー>	47.1mg (ピレンゼピン塩酸塩 無水物として45mg)	出過ぎる胃酸の分泌を抑えます。
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	900mg	胃酸を中和するとともに胃粘膜 を保護します。
炭酸水素ナトリウム	1,200mg	胃酸をすみやかに中和します。
ビオチンアスターゼ2000	30mg	食物の消化を促します。

添加物として、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mg、ℓ-メントールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないでください。



お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 ☎0120-028-193
受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>



Boehringer 提携

Ingelheim 日本ペーリンガーインゲルハイム株式会社