

胃腸薬

胃痛・胃もたれ・胸やけ

出すぎる胃酸をコントロール

ピレンゼピン塩酸塩水和物配合

胃液分泌抑制型胃腸薬

ガストール錠

GASTOL TABLETS

胃痛や胸やけといった症状は、ストレスやアルコールなどの刺激で、胃酸が過剰に分泌されたときに起こります。ガストール錠は、出すぎる胃酸を抑えて効く、胃腸薬です。

ガストール錠を服用すると…

はじめに…出すぎた胃酸をすみやかに中和し、胃粘膜を保護します。

次に…出すぎる胃酸の分泌を抑え、胃痛や胸やけなどにすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (2) 透析療法を受けている人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

4. 長期連用しないでください

🗨 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 授乳中の人。(3) 高齢者。(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。 排尿困難 (7) 次の診断を受けた人。 緑内障、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はきけ、胃部膨満感
その他	排尿困難、動悸、目のかすみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様 症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹 等があらわれる。

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、下痢、口のかわき

効能・効果

- 胃痛、胸やけ、胃酸過多、胸つかえ、げっぷ
- 胃もたれ、胃重、胃部不快感、胃部膨満感
- はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、飲みすぎ
- 食べすぎ、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感、消化促進、食欲不振



胃痛



胃もたれ



胸やけ

用法・用量

次の1回量を1日3回、毎食後に服用します。

年齢	成人（15才以上）	15才未満
1回量	3錠	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。

成分と作用

9錠（1日量）中

- ピレンゼピン塩酸塩水和物 47.1mg
（ピレンゼピン塩酸塩無水物として45mg）

出すぎる胃酸の分泌を抑えます。

- 炭酸水素ナトリウム 1,200mg

胃酸をすみやかに中和します。



- メタケイ酸アルミン酸
マグネシウム 900mg

胃酸を中和するとともに
胃粘膜を保護します。

- バイオアスターゼ2000 30mg

食物の消化を促します。

添加物として、CMC-Ca、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、ステアリン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)ビンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (5)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元



エスエス製薬株式会社

〒103-8481 東京都中央区日本橋浜町2-12-4

<http://www.ssp.co.jp/>



Boehringer 提携

Ingelheim 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社