

服用に際し、この説明書を必ず読むこと。また、必要なとき読めるように大切に保管すること。

胃腸薬

もたれ、飲み過ぎ、はきけ、胸やけに

第2類医薬品

# ガロールマックS顆粒

## 製品の特徴

ガロールマックS顆粒は、胃の炎症を抑える漢方薬の黄連解毒湯に使われている「オウゴン、オウバク、オウレン」の三黄をはじめとした生薬成分に、胃腸の機能を改善する生薬成分、胃の粘膜保護・修復をする成分が配合されています。

もたれ、飲み過ぎ、はきけ、胸やけなどによる不快な胃腸症状を改善します。



## 使用上の注意

## してはいけないこと

1. 次の人は服用しないこと。  
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないこと。

## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- 1) 医師の治療を受けている人。
- 2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 3) 次の診断を受けた人。

腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
便秘、下痢。
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

## 効能効果

食欲不振（食欲減退）、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心）、嘔吐、消化促進。

## 用法用量

次の1回量を1日3回 食前または食後に服用する。

年令	1回量
成人（15才以上）	1包
15才未満	服用しないこと


裏面に続く

成分分量 3包（成人1日量）中

(1包1.5g)

成 分	分 量	は たら き
オウゴン末	300mg	コガネバナの根を原料とし、消炎・鎮痛、健胃・消化などの作用があります。
オウバク末	300mg	キハダの樹皮を原料とし、消炎葉・苦味健胃薬などに用いられています。
オウレン末	150mg	オウレンの根茎を原料とし、健胃消化薬、整腸薬などに用いられています。
ニンジン末	120mg	オタネニンジンの根を原料とし、胃腸の弱っているとき、栄養障害があるときなどに用いられています。
カンゾウ末	210mg	甘草の根を原料とし、胃粘膜保護、健胃消化作用があります。
ケイヒ油	15mg	クスノキ科肉桂の樹皮を原料とし、食欲不振、消化不良などに用いられる芳香健胃薬です。
胆汁末	300mg	動物の胆汁を濃縮したもので、胃腸のはたらきを良くし、消化液の分泌を高めます。特に食物中の脂肪の消化を助け、胃もたれを緩和します。
ウルソデオキシコール酸	45mg	熊胆の薬効成分で、胃液・胆汁などの消化液の分泌を促進し、食物の消化を助けています。
アルジオキサ	120mg	損傷した胃の粘膜を修復するアラントインと胃粘膜を保護する水酸化アルミニウムの作用があります。
ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート	600mg	胃粘膜の傷ついた部分を保護します。

添加物として乳糖水和物、トウモロコシデンプン、香料、ケイ酸AI、無水ケイ酸、CMC-Ca、ステアリン酸Mgを含有する。



## 保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手のとどかない所に保管すること。
3. 他の容器に入れかえないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
4. 表示の使用期限を過ぎたものは服用しないこと。

## 問い合わせ先

1. 購入した薬局・薬店
2. 日水製薬医薬品販売株式会社 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987  
受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時  
(土・日・祝日を除く)



製造販売元  
日水製薬医薬品販売株式会社  
東京都台東区上野1-18-11

## 副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html) ☎ 0120-149-931