

この添付文書は、本剤をご使用になる前に、かならずお読みください。
またご使用になれる期間は、いつでも読めるように保管しておいてください。

胃もたれ、胃重、胃部不快感に **Groskyu** **グロスキュー® 胃腸薬**

医薬品

5種類の健胃生薬、2種類の消化酵素、利胆剤、3種類の制酸剤、
カンゾウエキス、クロレラ配合

●健胃生薬配合

ウイキョウ、オウレン、ケイヒ、ゲンチアナ、チョウジの5種類の生薬が消化液の分泌を促して、弱った胃腸の働きを回復させます。

●消化酵素配合

ビオチンアスターゼとリパーゼの2種類の消化酵素が、糖質、たん白質、脂質の消化を助けます。

●ウルソデオキシコール酸配合

胆汁の分泌を促し、脂肪の消化を助けます。

●制酸剤配合

炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムの3種類の制酸剤が、過剰の胃酸を中和し、胃の痛み、胸やけなどの症状をやわらげます。

●カンゾウエキス配合

生薬のカンゾウが荒れた胃粘膜を保護します。

●クロレラ原末配合

製剤の有用性を高めるために賦形剤としてクロレラ原末を1150mg配合しました。
本剤に配合したクロレラ原末はブランチングによって消化性を改良しましたので、胃腸に負担をかけません。

⚠使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人。
2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(5) 次の診断を受けた人
腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤・かゆみ

2週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
便秘、下痢

【成分・分量】1日分15錠中

ウイキョウ末	120mg	ウルソデオキシコール酸	40mg
オウレン末	50mg	カンゾウエキス粉末	72mg
ケイヒ末	120mg	炭酸水素ナトリウム	900mg
ゲンチアナ乾燥エキス	4mg	沈降炭酸カルシウム	300mg
チョウジ末	60mg	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	250mg
ビオチンアスターゼ2000	60mg	クロレラ原末（賦形剤）	1150mg
リパーゼAP6	90mg	添加物:クロレラ原末、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg	

【効能・効果】

- 胃もたれ、胃重、胃部不快感、飲みすぎ、食べすぎ、胃弱、食欲不振
- 胃部・腹部膨満感、胸つかえ、消化不良
- 胸やけ、げっぷ、胃痛、胃酸過多、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔い・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、消化促進

【用法・用量】 次の1回量を1日3回、食後に服用。

年 齢	15歳以上	11歳以上15歳未満	8歳以上11歳未満	5歳以上8歳未満	5歳未満
1 回 量	5錠	4錠	3錠	2錠	服用しないこと
服用回数	1日3回食後				×

（用法・用量に関する注意）

- (1) 定められた用法、用量をお守りください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 本剤は5歳未満の乳幼児に服用させないでください。

【保管および取り扱い上の注意】

- 1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- 2. 小児の手の届かないところに保管してください。
- 3. 他の容器に入れ換えないでください。
（誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。）
- 4. 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

（お問い合わせ先）

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

クロレラ工業株式会社 お客様相談室

東京都港区芝大門2丁目4番6号 フリーダイヤル ☎0120-819655 月～金曜日 9:00～17:00（祝日を除く）

発売元  **クロレラ工業株式会社**

東京都港区芝大門2丁目4番6号

製造販売元 **大昭製薬株式会社**

滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168