

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう保管してください。

胃腸薬

ロート胃腸薬 シロンス

「シロンス」は、胃内の酸度を調整する制酸剤を始め、食物の消化を助ける消化酵素や弱った胃の働きをよくする健胃生薬を配合した粉末状の胃腸薬です。

「シロンス」は、日頃起こりがちな のみすぎ・食べすぎ・胸やけ・胃痛などといった不快な症状にすぐれた効果をあらわします。

どうか、この「シロンス」を正しくご使用くださいまして、胃腸の健康にお役立てください。

使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある)
4. 長期連用しないでください。

■相談すること ■

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
(3) 高齢者
(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6) 次の症状のある人
排尿困難
(7) 次の診断を受けた人
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

(2) 2週間間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
口のかわき



■その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

のみすぎ、食べすぎ、胃もたれ、胃痛、胸やけ、胃酸過多、胃部・腹部膨満感、消化促進、消化不良、はきけ(むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、胃部不快感、げっぷ(おくび)、胃弱、胸つかえ、胃重、食欲不振(食欲減退)

用法・用量

次の量を食後、水又はお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
15才以上	1包	3回
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上 8才未満	1/3包	
5才未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量


有効成分と作用 (3包中)

	有効成分	配合量	作 用
健胃生薬	ケイヒ	120mg	特有の芳香や苦みをもち、食欲の増進をはかると共に、弱った胃の働きをよくする胃のためによい健胃生薬です。
	ケイヒ油	7mg	
	シュクシャ	90mg	
	センブリ	3mg	
制酸剤	炭酸水素ナトリウム	2286mg	速効性の制酸剤で多すぎる胃酸を中和し、胃酸過多や胃痛、胸やけ等の不快な症状を解消します。
	重質炭酸マグネシウム	498mg	
	沈降炭酸カルシウム	450mg	持続性の制酸剤で胃内の酸度を長く適正に保ち消化剤の働きやすい状態をつくります。また、胃壁を保護する働きもあります。
	サナルミン	402mg	
消化剤	ロートエキス	30mg	胃腸を支配している神経に作用して胃液の分泌を整えます。
	ビオチン	129mg	
	プロザイム	21mg	

添加物：L-メントール、セルロース、ケイ酸Al

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にポリエチレン袋のチャックを閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- (5) 1包を分けて服用したときの残りは、薬包紙を折り返して封をするように閉じ、2日以内に使用してください。



お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになったの ご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)