

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

消化酵素配合胃腸薬

ストマーゼ[®] 顆粒

STOMASE Granule

【特徴】

胃は健康の源です。食べ過ぎ、飲み過ぎ、消化不良や生活環境の複雑化に起因するストレス、精神的疲労・不安などによって胃の不調、不快感、機能の衰えなどが起こりがちです。

ストマーゼ顆粒は、こうした症状の改善に働く消化酵素剤、健胃生薬を配合した、のみやすい顆粒状の胃腸薬です。



【食べ過ぎ】



【胃もたれ】



【胸やけ】

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
(1) 透析療法を受けている人。
(2) フェニルケトン尿症の人。
2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の診断を受けた人。
腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、下痢

(必ず裏面もお読みください)

〔効能・効果〕

消化促進、食べ過ぎ（過食）、飲み過ぎ（過飲）、もたれ（胃もたれ）、消化不良、胃重、胃部膨満感、消化不良による腹部膨満感、胃部不快感、食欲不振（食欲減退）、胸やけ、胸つかえ、嘔吐、はきけ（むかつき、胃のむかつき）、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、胃痛、胃酸過多、げっぷ（おくび）

〔用法・用量〕

年 齢	1 回 量	用 法
成人（15才以上）	1包	1日3回、食後に服用してください。
11才以上 15才未満	2/3包	
8才以上 11才未満	1/2包	
5才以上 8才未満	1/3包	
3才以上 5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないでください。	

〈用法や用量に関する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法、用量を守ってください。

〔成 分〕 1日量（3包）中

成 分	分 量	は た ら き
ピオチアスターゼ2000	40mg	でんぷん及びたん白質を消化します。
ニューラーゼ	90mg	たん白質及び脂肪を消化し、栄養の吸収を促進します。
リパーゼAP6	60mg	脂肪を消化します。
ウルソデオキシコール酸	15mg	脂肪を乳化し、吸収を助けます。
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	600mg	胃内の過剰な酸を中和したり、胃粘膜を保護します。
水酸化マグネシウム	300mg	
ガジュツエキス	15mg (原生薬換算300mg)	特有の芳香と味が消化液の分泌を活発にし、食欲を増し、消化を良くし、胃の働きを整える健胃生薬成分です。
ケイヒ油	4mg	
ハッカ油	4mg	

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、カルメロースカルシウム、ポピドン、D-ソルビトール、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）及びヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室

TEL 03-3661-2080（ダイヤルイン）

月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）



発売元

ゼリア新薬工業株式会社
東京都中央区日本橋小舟町10-11



製造販売元

日新製薬株式会社
山形県天童市大字清池字藤段1331



D05
ストマーゼ顆粒
N05Q0