

この添付文書は、本剤の服用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



胃もたれ・むかつきに

タナベ胃腸薬〈調律〉

第2類
医薬品

「もたれる」「胃が重い」「ムカムカする」などの不快な症状は、“胃腸運動”の低下等が原因で引き起こされているのです。タナベ胃腸薬

■こんな方によく効きます。

〈調律〉は、当社が開発した“胃腸運動”調律剤MT(トリメプチンマレイン酸塩)を配合した胃腸薬。弱った胃腸をイキイキ動かす外からのMT効果と、内からの効果(消化・制酸・粘膜修復)により、不快な症状を改善。外と内から効いて、スッキリさせる胃腸薬です。



もたれ

むかつき

膨満感

不快感



使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。 排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。 腎臓病、肝臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	眠気、めまい、倦怠感、頭痛
その他	動悸、口内しびれ感、腹鳴

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2) 2週間位服用しても症状の改善がみられない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

効 能

- ◎胃もたれ、胃部膨満感、胃重
- ◎はきけ(胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき)、胃部不快感
- ◎食べすぎ、飲みすぎ、消化促進、消化不良による胃部・腹部膨満感
- ◎食欲不振、胃弱、消化不良、胸つかえ
- ◎胃痛、胸やけ、胃酸過多、げっぷ、嘔吐

用法・用量

次の量を食後約30分以内に、水またはお湯でかまずに服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	2錠	3回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 錠剤の取り出し方

- 「シート包装」の場合は、右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってシートごとのみ込んだりすると、シートが食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながる場合があります。)
- 「ビン包装」は上記の操作は必要ありません。



成分(6錠中)

	成 分	含 量	はたらき
上層	トリメブチンマレイン酸塩(MT)	300mg	胃腸運動を整える
	ビオヂアスターゼ2000	120mg	消化を助ける
中層	リパーゼAP6	45mg	消化を助ける
	カンゾウ末	150mg	粘膜を修復し、保護する
	ロートエキス	30mg	過剰な胃酸の分泌を抑える
下層	炭酸水素ナトリウム	300mg	胃酸を中和する
	沈降炭酸カルシウム	600mg	胃酸を中和する
	メタケイ酸アルミン酸マグネシウム(乾燥物換算)	240mg	胃酸を中和する

添加物：D-マンニトール、ポビドン、カルメロース、ステアリン酸Mg、ℓ-メントール、乳糖、エチルセルロース、セルロース、二酸化ケイ素

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビン包装の製品は服用のつどフタをよくしめてください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないでください。



製造販売元
田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜2-6-18

ホームページ www.mt-pharma.co.jp

本品のお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記をお願いいたします。
田辺三菱製薬「くすり相談センター」
(フリーダイヤル ☎0120-54-7080)
受付時間：弊社営業日の9:00～17:30