

和漢胃腸薬

第3類医薬品

五苓散

薬用ニンジン配合

効能・効果

食欲不振、胃部・腹部膨満感、
消化不良、胃弱、食べ過ぎ、
飲み過ぎ、胸やけ、胃もたれ、
胸つかえ、はきけ（むかつき、

胃のむかつき、二日酔・悪酔の
むかつき、嘔気、悪心、嘔吐、
整腸（便通を整える）、
軟便、便秘

製造販売元

大和製薬株式会社

奈良県御所市東佐味334-1

服用に際しては、この文書をよくお読み下さい。

黒玉龍膽丸 用法・用量 **第3類医薬品**

15才以上 1回30粒 8才以上11才未満1回15粒
11才以上15才未満1回20粒 5才以上 8才未満1回10粒
1日3回、食前または食間に服用する。

小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 1日量(90粒)中

日局 センブリ末	50mg	オウバク軟桐エキス	1000mg
日局 ゲンノショウコ末	1500mg	(原生薬換算量: 3000mg)	
日局 リュウタン末	300mg	添加物としてケイヒ末、甘草末、デヒドロ酢酸ナトリウム、寒梅粉、薬用炭を含む。	
日局 ニンジン末	500mg		

使用上の注意

相談すること

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

1. 医師の治療を受けている人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れかえないで下さい。

配置

期限

1包(30粒)入
¥150+税

お客様相談窓口 ☎0745-66-0112

