

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃の痛み・胃のむかつき・胸やけに

新キーパーU[®]細粒

第2類医薬品

速効かつ持続的に胃酸の分泌をコントロールし、荒れた胃を修復する

特徴

ストレスや食べすぎなどが原因で、胃に負担がかかると「胃の痛み」、「胃のむかつき」、「胃酸過多」などさまざまな胃の不快感が起こりやすくなります。

新キーパーU細粒は、「速効かつ持続的に胃酸の分泌をコントロールする成分」、「荒れた胃を修復する成分」、「弱った胃の働きを助ける成分」に「鎮痛や消化などの働きを持つ成分」が配合された緑の細粒です。食前・食間に服用することで、胃の不快感を改善します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

- 胃痛、胃酸過多、胸つかえ、胃重、げっぷ、胃弱
- はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）、胃部不快感、食欲不振（食欲減退）、飲み過ぎ、嘔吐
- 胸やけ、胃部・腹部膨満感、もたれ、消化不良、食べ過ぎ

胃の痛みに…



胸やけに…



用法・用量

次の1回量を1日3回、食前又は食間に服用してください。

年齢	15才以上	11才以上 ～15才未満	8才以上 ～11才未満	5才以上 ～8才未満	3才以上 ～5才未満	3才未満
1回量	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包	服用させないでください

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

3包(4.2g)中に次の成分を含んでいます。

成分・分量	作用
合成ヒドロタルサイト 1,200mg	過剰な胃酸を速効的かつ持続的に中和し、胃の酸度を適切に保つことにより、げっぷ・胸やけなど胃酸過多による不快な症状を抑えます。
炭酸水素ナトリウム 600mg	過剰な胃酸を速効的に中和する成分です。
ロートエキス 30mg	胃腸の動きをコントロールする神経に作用して、胃酸の分泌を抑え、胃の痛みをしずめます。
ウルソデオキシコール酸 15mg	胃液、膵液、胆汁の分泌促進作用と、もたれの原因になりやすい脂肪の消化吸収を促進する作用があります。
銅クロロフィリンナトリウム 45mg アカメガシワ(赤芽柏末) 400mg	銅クロロフィリンナトリウム(クロロフィルを安定化したもの)、赤芽柏末は、胃の粘膜組織を修復、保護します。
ハッカ油 30mg ウイキョウ油 12mg チョウジ油 12mg	芳香性・苦味性健胃生薬が口の粘膜や胃壁を刺激して、消化液の分泌を促し、食欲の増進をはかり、弱った胃の動きを回復します。
ジメチルポリシロキサン 60mg	微量で消泡作用を示し、胃に滞留した気泡やガスを取り除いて、不快なげっぷや胃の膨満感を除去します。
○添加物として乳糖水和物、バレイショデンプン、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ℓ-メントール、エタノール、香料を含有します。	

<成分・分量に関連する注意>

本剤の服用により便が緑色になることがありますが、配合されている銅クロロフィリンナトリウム（緑色）によるものであり、心配ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (4) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、または下記にお願い申し上げます。
カイゲンファーマ株式会社 お客様相談室 電話 06-6202-8911
受付時間：9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）