

服用前にこの説明文書を必ず読むこと。
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

第2類医薬品

緑の胃腸薬

〈和漢薬配合〉新サロミン

昔から“腹は健康のもと”と言われるように常日頃より胃腸の調子を整えておくことが大切です。近年社会環境の多様化・複雑化にともない生活のリズムが不規則となりストレスが蓄積し、胃腸の不調や不快感などを訴える方が多くなっております。緑の胃腸薬は胃痛、胸やけその他の不快な症状を改善し、衰え弱った胃腸の働きをたかめるよう和漢薬を配合し、その特性を十分に生かしましたので、激しく消耗する現代人の胃腸病にすぐれた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがある。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - （1）医師の治療を受けている人。
 - （2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - （3）高齢者。
 - （4）薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - （5）次の症状のある人。
排尿困難
 - （6）次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
口のかわき、便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

その他の注意

母乳が出にくくなる可能性がある。

効能・効果

胃痛、胃弱、食欲不振、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、はきけ（むかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心）、胃酸過多、胸やけ、胃部・腹部膨満感、胃部不快感、胃重、嘔吐、もたれ、胸つかえ、げっぷ

用法・用量

次の量を食後服用すること。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15歳以上	1 包	3 回
11歳以上15歳未満	2/3包	
8 歳以上11歳未満	1/2包	
5 歳以上 8 歳未満	1/3包	
3 歳以上 5 歳未満	1/4包	
3 歳未満	服用しないこと	

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 用法・用量を厳守すること。

組成と作用 1 日量 3 包中に次の成分を含む。

成 分	3 包中	主な作用
カンゾウエキス粉末 (カンゾウ500mgに相当)	35mg	痛みや痙れんをゆるめ緊張をなだめる。
ウイキョウ末	100mg	新陳代謝を正常にし食欲を増進させる。
ケイヒ末	200mg	
ショウキョウ末	75mg	胃液や消化液の分泌を促し消化をたすける。
オウバクエキス (オウバク375mgに相当)	125mg	胃・腸の動きを正常に保つ作用がある。
ロートエキス	30mg	胃腸の痙れんを鎮め、腹痛を治める。
炭酸水素ナトリウム	900mg	過剰の胃酸をすばやく中和する。
酸化マグネシウム	400mg	制酸作用を持ち、作用は炭酸水素ナトリウムより遅効性である為、制酸効果が持続する。

添加物：銅クロロフィリンNa、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、セルロース、バレイショデンプン、香料、l-メントール

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）。
- (4) 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用すること。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先
田村薬品工業株式会社 お客様相談室
06-6203-5151
受付時間 10:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

製造販売元

田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50