

服用に際して、この説明文書を必ず読むこと
必要時に読めるように大切に保管すること

第2類医薬品

胃のもたれ、食べすぎ、胸やけに

新フジサワ胃腸薬クール

生薬配合

〔新フジサワ胃腸薬クールの特徴〕

1. 芳香性健胃生薬シュクシャ末、チョウジ末、ケイヒ末の配合により、胃の働きを良くします
2. 脂肪の消化を助けるリパーゼとデンプンの消化を助けるピオジアスターゼの働きにより、食物の消化を高めます
3. カンゾウ末と制酸剤の働きにより、胃を保護します

〔新フジサワ胃腸薬クールはこんな時に〕



〔使用上の注意〕



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人または家族がアレルギー体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4) 次の診断を受けた人
腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください
便秘、下痢

【効能】

もたれ(胃もたれ), 食べすぎ(過食), 飲みすぎ(過飲), 胸やけ, 胃部・腹部膨満感, 消化不良, 消化促進, 食欲不振(食欲減退), 胃弱, 胃酸過多, 胸つかえ, 胃部不快感, 胃重, げっぷ(おくび), はきけ(むかつき, 胃のむかつき, 二日酔・悪酔のむかつき, 嘔気, 悪心), 嘔吐, 胃痛, 胃部膨満感, 消化不良による胃部・腹部膨満感

【用法・用量】

次の量を, 水またはお湯で服用してください

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1包	3回 (毎食後)
11歳～15歳未満	2/3包	
8歳～11歳未満	1/2包	
5歳～ 8歳未満	1/3包	
3歳～ 5歳未満	1/4包	
3歳未満	服用しないこと	

小児に服用させる場合には, 保護者の指導監督のもとに服用させてください

【成分・分量】

本剤は, 緑色で特異な芳香と清涼味がある顆粒で, 1包(1.5g)中に次の成分を含有する

シュクシャ末	20mg
チョウジ末	35mg
ケイヒ末	80mg
カンゾウ末	100mg
ビオジアスターゼ	100mg
リパーゼ	20mg
炭酸水素ナトリウム	550mg
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	400mg
添加物: トウモロコシデンプン, ヒドロキシプロピルセルロース, 銅クロロフィリンNa, 無水ケイ酸, <i>l</i> -メントール	

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり, 品質が変わる)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には, 袋の口を折り返して保管し, 2日以内に服用してください
- (5) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

本品についてのお問い合わせは, お買い求めのお店, または下記にお願い致します

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8541 東京都中央区日本橋小網町1-8
電 話 03 (6667) 3232
受付時間 9:00～17:00 (土, 日, 祝日を除く)

ホームページ <http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>



Daiichi-Sankyo

製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

東京都中央区日本橋小網町1-8