

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 食べすぎ・飲みすぎ・胸やけ

新佐藤胃腸薬〈分包〉

新佐藤胃腸薬〈分包〉は、制酸成分、消化酵素、健胃生薬を配合した胃腸薬です。

新佐藤胃腸薬〈分包〉は、速効性で持続性の制酸成分である合成ヒドロタルサイト、複合消化酵素ジオキサスターゼ1000、鎮痛作用のあるロートエキスを5種類の健胃生薬を配合した服用しやすい胃腸薬です。食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、はきけ、胃痛、消化不良による胃部・腹部膨満感などに効果があります。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください。
透析治療を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)
4. 長期連用しないでください。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。
排尿困難
(7)次の診断を受けた人。
腎臓病、心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2)2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
口のかわき、下痢、便秘

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

裏面もお読みください

効能又は効果

食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、胃酸過多、胃部不快感、胃もたれ、胃痛、はきけ（胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき）、嘔吐、胸つかえ、げっぷ、食欲不振、消化不良、胃弱、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法及び用量

次の量を食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 包	3 回
11歳～14歳	2/3包	
8 歳～10歳	1/2包	
5 歳～7 歳	1/3包	
乳幼児（5歳未満）	服用しないこと	

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)定められた用法及び用量を守ってください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

3 包（成人の1日量）中

成 分	含 量	は た ら き
合成ヒドロタルサイト	1500mg	過剰の胃酸を中和して、不快な過酸症状を改善します。
ピオザアスターゼ1000	150mg	炭水化物、蛋白質、脂肪の消化を助けます。
ロートエキス	30mg	胃酸の分泌を抑え、胃の痛みを和らげます。
ゲンチアナ末	75mg	低下した胃腸の働きを活発にし、消化液の分泌を促して消化機能を整えます。
ショウキョウ末	120mg	
ケイヒ末	300mg	
ウイキョウ末	105mg	
チョウジ末	60mg	

添加物として l-メントール、乳糖水和物、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。
- (5)配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

問い合わせ先

- 1)本製品の購入先
- 2)佐藤薬品工業株式会社 医薬情報室
TEL 0744-28-0021 受付時間 9：00～16：30（土・日・祝日を除く）

製造販売元



佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町 9 番地の 2