

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

胃 腸 薬  
お お く さ い ち ょ う さ ん  
**大草胃腸散**  
お お く さ い ち ょ う さ ん  
**大草胃腸散** (分包)

## 特 徴

- 大草胃腸散及び大草胃腸散(分包)は、健胃作用のある生薬を主とし、消化を助ける牛胆汁エキス末、さらに胃酸中和作用をもつ成分を配合した胃腸薬です。
- 胃がもたれて膨満感のある方、胸やけがしたり、胃痛や胃弱でお悩みの方によく効きます。
- 二日酔や消化不良、飲み過ぎ・食べ過ぎ、食欲不振のときにも効果的です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1) 2週間位服用しても症状がよくなる場合。

## 効 能

- もたれ(胃もたれ)、胃部・腹部膨満感、胃部不快感、胃重
- 食欲不振(食欲減退)、飲み過ぎ、食べ過ぎ、げっぷ(おくび)、消化不良
- 胃痛、胃酸過多、胸やけ、胸つかえ、胃弱
- はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心、嘔吐



もたれ



飲み過ぎ、食べ過ぎ



胃のむかつき


## 用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で服用してください。

大草胃腸散(缶入)を服用の際には、添付の<sup>さし</sup>匙をご使用ください。

| 年 齢           | 1 回量         | 1 日服用回数 |
|---------------|--------------|---------|
| 成人(15 歳以上)    | 1.5 g ( 1 包) | 3回      |
| 11 歳以上 15 歳未満 | 1.0 g (2/3包) |         |
| 8 歳以上 11 歳未満  | 0.75g (1/2包) |         |
| 5 歳以上 8 歳未満   | 0.5 g (1/3包) |         |
| 5 歳未満         | 服用しないでください   |         |

### 匙の使用法



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分

成人の1日服用量3包(4.5g)中

| 成分           | 含量     | 作用                              |
|--------------|--------|---------------------------------|
| オウバク末(黄柏末)   | 800 mg | 苦味健胃作用により消化を助け、食欲を高めます。         |
| オウレン末(黄連末)   | 100 mg |                                 |
| ケイヒ末(桂皮末)    | 240 mg | 芳香性健胃作用とともに胃痛を緩和します。            |
| チョウジ末(丁子末)   | 50 mg  | 芳香性健胃作用とともに吐き気を抑えます。            |
| ショウキョウ末(生姜末) | 100 mg |                                 |
| ウイキョウ末(茴香末)  | 100 mg | 胃腸の動きを活発にし、膨満感を解消します。           |
| キシツ末(枳実末)    | 300 mg | 胃のつかえをとり、膨満感を解消します。             |
| ボレイ末(牡蛎末)    | 700 mg | 胃酸を中和し、胃痛を緩和します。<br>脂肪の消化を助けます。 |
| 牛胆汁エキスマ      | 125 mg |                                 |
| 沈降炭酸カルシウム    | 995 mg | 胃酸を中和します。                       |
| ケイ酸マグネシウム    | 400 mg |                                 |

添加物としてℓ-メントール、パレイショデンプンを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 大草胃腸散(缶入)は、独特の香気がいつまでも保たれるように、使用後は容器の蓋をしっかりと閉じておいてください。
- (6) 場合により、添付の匙に薬が付着することがありますが、これは静電気を帯びたためであり、薬効その他に何ら異常はありません。



お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：03(3370)7174(代表)

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

発売元



**日邦薬品工業株式会社**

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



**大草薬品株式会社**

横須賀市森崎1-17-15