

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第2類
医薬品

胃 腸 薬
お お く さ い ち ょ う さ ん
大草胃腸散
お お く さ い ち ょ う さ ん
大草胃腸散 (分包)

特 徴

- 大草胃腸散及び大草胃腸散(分包)は、健胃作用のある生薬を主とし、消化を助ける牛胆汁エキス末、さらに胃酸中和作用をもつ成分を配合した胃腸薬です。
- 胃がもたれて膨満感のある方、胸やけがしたり、胃痛や胃弱でお悩みの方によく効きます。
- 二日酔や消化不良、飲み過ぎ・食べ過ぎ、食欲不振のときにも効果的です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 2週間位服用しても症状がよくなる場合。

効 能

- もたれ(胃もたれ)、胃部・腹部膨満感、胃部不快感、胃重
- 食欲不振(食欲減退)、飲み過ぎ、食べ過ぎ、げっぷ(おくび)、消化不良
- 胃痛、胃酸過多、胸やけ、胸つかえ、胃弱
- はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心、嘔吐



もたれ



飲み過ぎ, 食べ過ぎ



胃のむかつき


用法・用量

次の量を、食後に水またはお湯で服用してください。

大草胃腸散(缶入)を服用の際には、添付の^{さし}匙をご使用ください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	1.5 g (1 包)	3回
11 歳以上 15 歳未満	1.0 g (2/3包)	
8 歳以上 11 歳未満	0.75g (1/2包)	
5 歳以上 8 歳未満	0.5 g (1/3包)	
5 歳未満	服用しないでください	

匙の使用法



<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分

成人の1日服用量3包(4.5g)中

成分	含量	作用
オウバク末(黄柏末)	800 mg	苦味健胃作用により消化を助け、食欲を高めます。
オウレン末(黄連末)	100 mg	
ケイヒ末(桂皮末)	240 mg	芳香性健胃作用とともに胃痛を緩和します。
チョウジ末(丁子末)	50 mg	芳香性健胃作用とともに吐き気を抑えます。
ショウキョウ末(生姜末)	100 mg	
ウイキョウ末(茴香末)	100 mg	胃腸の動きを活発にし、膨満感を解消します。
キシツ末(枳実末)	300 mg	胃のつかえをとり、膨満感を解消します。
ボレイ末(牡蛎末)	700 mg	胃酸を中和し、胃痛を緩和します。
牛胆汁エキスマ	125 mg	脂肪の消化を助けます。
沈降炭酸カルシウム	995 mg	胃酸を中和します。
ケイ酸マグネシウム	400 mg	

添加物としてℓ-メントール、バレイショデンブンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 1包を分割した残リを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 大草胃腸散(缶入)は、独特の香気がいつまでも保たれるように、使用後は容器の蓋をしっかりと閉じておいてください。
- (6) 場合により、添付の匙に薬が付着することがありますが、これは静電気を帯びたためであり、薬効その他に何ら異常はありません。



包装

110g 190g 380g 30包 54包 92包

お問い合わせ先

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

電話：03(3370)7174(代表)

受付時間：9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

(独)医薬品医療機器総合機構
副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

発売元



日邦薬品工業株式会社

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



大草薬品株式会社

神奈川県横須賀市森崎1-17-15