

腸胃丸

第2類医薬品

健胃
整腸

赤玉

赤玉

第2類医薬品 6包 生薬製剤

腸胃丸

健胃・整腸

健胃・整腸
製造番号
配置期限

第2類医薬品
腸胃丸
健胃
整腸

第2類医薬品 健胃 腸胃丸 整腸

効能又は効果

胃もたれ、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、飲みすぎ、胸やけ、胸つかえ、胃部・腹部膨満感、食欲不振、消化不良、胃弱、食べすぎ、整腸(便通を整える)、軟便、便秘

用法及び用量

大人(15歳以上)..... 1回45丸(1包)
11歳以上15歳未満..... 1回30丸(2/3包)
1日3回、食前又は食間に服用してください。
(11歳未満は服用しないでください。)

製造販売元

 佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町9番地の2



成分及び分量

3包(135丸)Ⅹ大人の1日量Ⅹ中
センブリ末..... 50mg
ゲンチアナ末..... 250mg
ショウキョウ末..... 250mg
オウバク末..... 1000mg
ゲンノショウコ末..... 1500mg
ロートエキス..... 30mg

添加物としてデヒドロ酢酸Na、赤色2号、赤色102号、寒梅粉、ヒプロメロース、酸化チタン、タルクを含有しています。

注意

- 1.服用に際しては、添付の使用上の注意書をよくお読みください。
- 2.直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 3.小児の手の届かない所に保管してください。
- 4.配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。

1包45丸入 6包 ¥700



ここからお出し下さい

品目番号 奈良2巻44-109

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

80F®

ご使用に際して、この注意書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃腸薬の使用上の注意

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 1カ月位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

用法及び用量に関連する注意

- (1) 定められた用法及び用量を守ってください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないでください。