



第2類医薬品 健胃 整腸 腸胃丸

赤玉

第2類医薬品 6包 生薬製剤

赤玉

第2類医薬品

健胃 整腸 腸胃丸

健胃・整腸 腸胃丸

健胃・整腸 製造番号 配置期限

製造販売元 佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市観音寺町9番地の2
TEL 0744-28-0021
受付時間 9:00~16:30 (土日祝日を除く)



効能・効果

胃もたれ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、悪心)、嘔吐、飲みすぎ、胸やけ、胸つかえ、胃部・腹部膨満感、食欲不振、消化不良、胃弱、食べすぎ、整腸(便通を整える)、軟便、便秘

用法・用量

大人(15歳以上).....1回45丸(1包)
11歳以上15歳未満.....1回30丸(2/3包)
1日3回、食前又は食間に服用してください。
(11歳未満は服用しないでください)

成分・分量

3包(135丸)(大人の1日量)中
センブリ末.....50mg
ゲンチアナ末.....250mg
ショウキョウ末.....250mg
オウバク末.....1000mg
ゲンノショウコ末.....1500mg
ロートエキス.....30mg

添加物：デヒドロ酢酸Na、赤色2号、赤色102号、寒梅粉、ヒプロメロース、酸化チタン、タルク

注意

- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起したことがある人。
(5)排便困難のある人。
(6)心臓病、緑内障の診断を受けた人。
- 服用に際しては、説明書をよくお読みください
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください

1包45丸入 6包

ここからお出し下さい



1 2 3 4 5 6 7 8 9

品目番号 奈良2巻44-109

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931 02D8

* 2011年10月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃腸薬の使用上の注意

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください
（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。
排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。
心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。