

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

養 成 煎

(胃 腸 薬)



使 用 上 の 注 意



相談 する こと

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 体の虚弱な人 (体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人
 - (5) 胃腸の弱い人
 - (6) 発汗傾向の著しい人
 - (7) 高齢者
 - (8) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
 - (9) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
 - (10) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	腹痛、悪心、食欲不振、胃部不快感、 はげしい腹痛を伴う下痢

- (2) 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください。

効能・効果

食欲減退、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃弱、胸やけ、胸つかえ、はきけ（むかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、整腸（便通を整える）

用法・用量

本品1袋を煎じる容器(鉄製のものは使用しない)に入れ、水550mL(約3合)を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこばれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ成人1日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1日分の1/3量	3 回
15歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 服用に際しては人肌程度に温めて服用してください。

成分・分量

本品1袋(1袋25.1g)中、下記生薬を含有します。

キ ジ ツ	-----	2.0g	コ ウ ボ ク	-----	2.0g
エ ン ゴ サ ク	-----	1.5g	ソ ウ ジ ュ ツ	-----	1.5g
チ ン ビ	-----	1.0g	ニ ン シ ン	-----	1.0g
カ ン ゾ ウ	-----	0.9g	ハ ッ カ	-----	0.9g
ケ イ ヒ	-----	0.4g	オ ウ レ ン	-----	0.3g
シ ャ ク シ ャ	-----	0.3g	モ ッ コ ウ	-----	0.3g
ヤ ク チ	-----	0.3g	ウ バ イ	-----	2.3g
ウ ヤ ク	-----	0.5g	サ ン ザ シ	-----	2.0g
シ ソ シ	-----	2.0g	アカメガシワ	-----	5.0g
カ ン キ ヨ ウ	-----	0.9g			

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 煎じた薬液は冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7