

胃酸過多・胃痛治療剤

NEORON
ネオロン®

胃は過度の緊張や食べ過ぎ、飲み過ぎによって粘膜が敏感になり、荒れ易く、ただれる事があります。そして胃が痛い、胃酸過多、げっぷなど軽い体調の変化で起こる不快な症状は、胃の正常な働きに大きな負担をかけています。

〈ネオロン〉は、早く溶け速やかに胃に作用し、各症状に対して効果的です。

 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。
排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、緑内障
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難
 - (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
口のかわき、便秘、下痢

【効 能・効 果】

胃痛、腹痛、さしこみ（疝痛、癰）、胃酸過多、胸やけ

【用 法・用 量】

大人（15歳以上） 1回5錠

11歳以上15歳未満 1回3錠

1日3回、食後または疼痛時服用してください。

なお、服用間隔は4時間以上おいてください。

【用法・用量に関する注意】

1. 11歳未満の人は服用しないでください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 定められた用法・用量を守ってください。

【成分・分量及び作用】

有 効 成 分		1日量(15錠)中	作 用
胃痛鎮痙剤	臭化メチルペナクチジウム	30mg	胃液により、ひきつったり、ゆるんだりする胃の筋の痛みや、荒れ・炎症（ただれ）による痛みを速やかにしずめます。
制 酸 剤	乾燥水酸化アルミニウムゲル 合成ケイ酸アルミニウム 炭酸水素ナトリウム	1800mg 1500mg 1050mg	余分な胃酸を中和・吸収によって下げ、酸の濃度を早く、そして長く一定に保ち、胸やけ、げっぷなどの過酸症状を改善し、食欲を増進させます。
粘膜修復剤	カンゾウエキス	150mg	胃の粘膜を保護し、炎症（ただれ）に対して強い抑制作用があります。また過度の緊張をなだめ、他の薬が働き易いようにします。

その他、添加物として、パレイショデンプン、アラビアゴム末、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース及びタルクを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記会社「相談窓口」までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元：松田薬品工業株式会社

愛媛県松山市河野中須賀318

電話（089）994-1333

【受付時間 8:30～17:00
（土、日、祝日を除く）】