

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## 胃腸鎮痛鎮痙薬

第2類医薬品

## 胃腸反魂丹



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる〕

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください  
他の胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください  
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります)
3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3)高齢者。  
(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。  
(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(6)次の症状のある人。  
排尿困難  
(7)次の診断を受けた人。  
心臓病、緑内障
  2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください  
(1)服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位  | 症 状                |
|-------|--------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ          |
| 精神神経系 | 頭痛                 |
| その他   | 顔のほてり、異常なまぶしさ、排尿困難 |
- (2)5～6回服用しても症状がよくなる場合
  3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください  
□のかわき、便秘

#### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります

裏面もよくお読みください。



## 【効能・効果】

胃痛、腹痛、さしこみ（<sup>せんつう</sup>疝痛、<sup>しゃく</sup>癪）、胃酸過多、胸やけ

## 【用法・用量】

成人（15歳以上） …… 1回30丸    11歳以上15歳未満 …… 1回20丸  
8歳以上11歳未満 …… 1回15丸    5歳以上8歳未満 …… 1回10丸  
3歳以上5歳未満 …… 1回7丸

1日2回を限度とし、服用してください。

服用間隔は4時間以上おいてください。

●3歳未満の乳幼児には服用させないでください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)3歳以上の幼児に服用させる場合には、薬剤がのどにつかえることのないよう、よく注意してください。

## 【成分・分量】

1日量（60丸）中

エンメイソウ ……900mg    ゲンチアナ ……200mg  
オウバク ……1200mg    モッコウ ……100mg  
オウレン ……500mg    ロートエキス ……40mg  
添加物として、炭酸Ca、寒梅粉、サリチル酸、カルメロースNa、タルク、アラビアゴム、薬用炭、三二酸化鉄を含有する。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5)配置期限の過ぎた製品は使用しないでください。

## ■お問い合わせ先

本品に関するお問い合わせは、お買い求め先、または下記に  
お願い申し上げます。

株式会社 廣貫堂 「お客様相談窓口」

電話番号：076-424-2259

受付時間：9時から17時まで（土・日・祝祭日を除く）

製造販売元



株式会社 廣貫堂

〒930-0055 富山市梅沢町2丁目9-1

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
（独）医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）