

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

止瀉・整腸剤

ベルランゼットS

BERLAN Z-S

〔特 徴〕

下痢の原因には暴飲暴食による消化不良や、腸内発酵、細菌による食中毒など色々あります。

ベルランゼットSは、これらの下痢に対し奏効する殺菌、止瀉、防腐作用をもつタンニン酸ベルベリン、生薬の乾燥エキスであるゲンノショウコ乾燥エキス末、さらに胃腸などの粘膜への刺激が少ないので小児の下痢にも使用されているタンニン酸アルブミン、下痢による消耗性疾患を改善する塩酸チアミン（ビタミンB₁）を配合した、止瀉・整腸剤です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

●次の人は服用しないでください

本剤又は牛乳によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
- (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人。
（本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。）
- (4) 高齢者。
- (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

〔効能・効果〕

下痢、消化不良による下痢、食あたり、くだり腹、軟便、はき下し、水あたり

〔用法・用量〕

年 齢	1回量	用 法
成人(15才以上)	2カプセル	1日3回を限度として服用してください。 なお、服用間隔は4時間以上おいてください。
8才以上15才未満	1カプセル	
8才未満	服用しないでください。	

（必ず裏面もお読みください）

〈用法や用量に関する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 定められた用法、用量を厳守してください。
- (3) (カプセル剤の取り出し方)

右図のようにカプセル剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



〔成 分〕 1日量(6カプセル)中

成 分	分量	はたらき
タンニン酸ベルベリン	240mg	腸内でベルベリンとタンニン酸になり、殺菌作用と収れん防腐作用を発揮します。
タンニン酸アルブミン	1200mg	腸内でアルブミンとタンニン酸になり、腸内で収れん作用を及ぼし、しかも胃腸などの粘膜への刺激が少ない成分です。
ゲンノショウコ乾燥 エキス末	162mg (原生薬換算1620mg)	タンニン、没食子酸を含み、止瀉、整腸に効果を示します。
塩酸チアミン	12mg	下痢にともなう消耗性疾患などにおける、ビタミンB ₁ 補給として効果があります。

添加物として、沈降炭酸カルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、ゼラチン、黄色五号、酸化チタン及びラウリル硫酸ナトリウムを含有する。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 外箱に表示の使用期限内に服用してください。また、使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室
TEL 03-3661-2080 (ダイヤルイン)
月～金曜日 9:00～17:00 (祝祭日を除く)



製造発売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11



F03

ベルランゼットS