服用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

止瀉薬

マイベリンU

本剤は、黄柏の有効成分であるベルベリンとゲンノショウコエキスを主剤とし、それに腓腸筋痙れんや腸疝痛などの痛み止めとして使われた漢方薬「芍薬甘草湯」に従い、芍薬と甘草とを配合し、主として和漢生薬を用いて製した下痢止めです。

⚠使用上の注意

⊠ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1．次の人は服用しないで下さい

透析療法を受けている人。

2．本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい

胃腸鎮痛鎮痙薬

3．授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい

（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。）

4．長期連用しないで下さい

相談すること

1．次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい

（1）医師の治療を受けている人。
（2）発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
（3）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（4）高齢者。
（5）本人又は家族がアレルギー体質の人。
（6）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
（7）次の症状のある人。
　排尿困難
（8）次の診断を受けた人。
　心臓病、緑内障、腎臓病

2．次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

（1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

（2）5～6日間服用しても症状がよくならない場合

3．次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい

口のかわき、便秘、下痢

その他の注意

母乳が出にくくなることがあります。

（裏面に続きます）

適応症

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢。

用法・用量

服用間隔は4時間以上おいて下さい。

年　齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	3錠	3回
11歳以上15歳未満	2錠	3回
5歳以上11歳未満	1錠	3回
5歳未満	服用しないで下さい	

（1）用法・用量を厳守して下さい。

（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

（3）錠剤の取り出し方。
図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

PTPシート取り出し図

組成　1日量9錠中に次の成分を含んでいます。

成　分	9錠中
塩化ベルベリン	300mg
ゲンノショウコエキス （ゲンノショウコ7560mgに相当）	1080mg
シャクヤク末	300mg
甘草エキス粉末 （カンゾウ751mgに相当）	52.5mg
ロートエキス	45mg
メタケイ酸アルミン酸マグネシウム	700mg

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、トウモロコシデンプン、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、アスパルテーム（L−フェニルアラニン化合物）、香料、ビタミンE

保管及び取扱い上の注意

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。

（2）小児の手の届かない所に保管して下さい。

（3）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）

お問い合わせ先
田村薬品工業株式会社 お客様相談室
0745-66-2636
受付時間　10:00〜17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元 **田村薬品工業株式会社**
奈良県御所市西寺田50