

Kracie

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

下痢・食あたり・水あたり
止しゃ薬（下痢止め）

ワカ末止瀉薬錠

特徴

- ベルベリン塩化物水和物とゲンノショウコエキスによっておなかの調子を整え、下痢・食あたり・水あたり・軟便などに効果があります。
- 服用しやすいフィルムコーティング錠です。

⚠️ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 発熱を伴う下痢、血便、粘液便のある人
- (3) 急性の激しい下痢又は腹痛・腹部膨満・はきけ等の症状を伴う下痢のある人（本剤で無理に下痢をとめるとかえって病気を悪化させることがあります。）
- (4) 高齢者

2. 次の場合は、服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

5～6日間服用しても症状がよくなるらない場合

効能

下痢、食あたり、水あたり、軟便、
消化不良による下痢、はき下し、
くだり腹



下痢



はき下し

用法・用量

1日3回を限度とし服用する。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）	2錠	3回
15才未満8才以上	1錠	
8才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 錠剤の取り出し方
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)

(PTPの取り出し図)



おしだす

成分

成人1日の服用量6錠（1錠155mg）中、次の成分を含んでいます。
ベルベリン塩化物水和物…………… 225mg
ゲンノショウコエキス…………… 600mg（原生薬4gに相当）
添加物として、軽質無水ケイ酸、CMC-Ca、結晶セルロース、合成ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、黄色三二酸化鉄、カルナウバロウを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物（生薬）のエキスを配合していますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限のすぎた商品は服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。



(裏面につづきます)

●消化のよいものを



下痢症状が軽くなってきたら食事はまずお粥から始めて半熟卵、白身の魚、煮物など消化のよいものをとるようにします。
下痢が長く続く場合には肉類、油、甘いものなど消化の悪いものを避けましょう。

●水分の補給も必要



急性の下痢のときには、まず安静にすることです。
症状が強いときは、脱水症にかかりやすいので、湯ざましやうすい番茶など少量ずつ水分を補給しましょう。

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334
受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

Before use, read this instruction sheet.
Keep this sheet carefully for future reference.

For diarrhea, food poisoning and water poisoning
Antidiarrheals
WAKAMATU® SHISHAYAKU TABLETS

Features

- Berberine chloride and extract of *Geranium thunbergii* adjust the bowel conditions to mitigate the effects of diarrhea, food poisoning, water poisoning and soft stool.
- Easy-to-take film coated tablet type of medicine

Precautions for Use

Consult your physician or pharmacist.

- In any of the following cases, consult your physician or pharmacist before taking the medicine.
 - You are receiving medical treatment by a physician.
 - You have diarrhea with fever, bloody stool or mucous stool.
 - You have acute and severe diarrhea, or diarrhea with abdominal pain, feeling of fullness in the bowel, or nausea. (If you bind the bowels forcibly with this medicine, the disease might become worse.)
 - You are of advanced age.
- If your condition does not improve even after taking the medicine for five or six days, stop the medication and seek advice from your physician or pharmacist, taking this sheet with you.

Indications

Diarrhea, food poisoning, water poisoning, soft stool, diarrhea due to indigestion, vomiting and purging, and loose bowels.

Dosage and Administration

Take the following dose up to three times per day, at intervals of at least 4 hours.

Age	Dose	Times of medication per day
Adults(over 15 years old)	2 tab.	3 times
Children aged 8 to 15 years old	1 tab.	3 times
Children under 8 years old	Should not take this medicine	

Notes on dosage and administration

- Children must take the medicine under the guidance and supervision of a guardian.
- How to take out a tablet

As shown in the right figure, with your fingertip strongly push the convex portion of the PTP sheet containing a tablet. (Swallowing a tablet without removing the PTP sheet by mistake may cause unexpected problems such as the PTP sheet sticking to the mucous membrane of the throat.)

(How to remove medicine
from the PTP sheet.)

Push out the tablet ↓



Composition

6 tablets (155mg per tablet) to be taken by an adult per day contain the following ingredients.

Berberine Chloride Hydrate : 225mg

Extract of *Geranium thunbergii* : 600mg (corresponding to 4g of crude drug)

The additives Light Anhydrous Silicic Acid, Carmellose Calcium, Microcrystalline Cellulose, Synthetic Aluminum Silicate, Magnesium Stearate, Hypromellose, Titanium Oxide, Yellow Ferric Oxide, Carnauba Wax are contained.

Notes on composition

This medicine is formulated using extracts from natural substances (crude drugs), therefore the color of tablets may vary somewhat.

Precautions for storage and handling

- Store the medicine in a cool, dry place not exposed to direct sunlight.
- Keep out of the reach of children.
- Do not repack the medicine into another container. (It may cause misuse or deterioration of quality.)
- Do not consume the medicine after the expiry date.
- In case the tablets absorb moisture of the air it would possibly cause them some discoloration or mottles.
So make it in mind to keep the tablets out of any drop of water and not touch them with wet hand directly.

Distributed by **Kracie Pharmaceutical, Ltd.**
20-20, Kaigan 3-chome,
Minato-ku, Tokyo 108-8080, Japan.

Manufactured and Distributed by **Kracie Pharma, Ltd.**
20-20, Kaigan 3-chome,
Minato-ku, Tokyo 108-8080, Japan.

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **クラシエ製薬株式会社**
東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)