

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

《止瀉薬》

下痢・食あたりに

第2類医薬品

新第一赤玉はら薬



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. **本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください**

胃腸鎮痛鎮痙薬

2. **授乳中の人**は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を
けてください

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)



相談すること

1. **次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください**

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。

(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(4) 高齢者。

(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(7) 次の症状のある人。 排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障

2. **次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください**

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合

3. **次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は
増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談し
てください**

口のかわき

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

用法・用量

次の1回量を、1日3回を限度として服用してください。
服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
15才以上	18丸（1包）	3回
11才以上15才未満	12丸	
8才以上11才未満	9丸	
5才以上8才未満	6丸	
5才未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

新第一赤玉はら薬は、1日量54丸中に次の成分を含んでいます。

成 分	54丸中	成 分	54丸中
オウバク末	720mg	センブリ末	30mg
オウレン末	150mg	ロートエキス散	300mg
ゲンノショウコ末	480mg	（ロートエキス	30mg）

添加物として、デヒドロ酢酸Na、乳糖、寒梅粉、アラビアゴム、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、ゼラチン、赤色102号及び黄色5号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限（ケースに記載）を過ぎた製品は、服用しないでください。

お問い合わせ先

第一薬品株式会社 お客様相談室
電話 076 (432) 2736（代表）
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

第一薬品株式会社
富山県富山市荒川一丁目4番26号