

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

《止瀉薬》

下痢・食あたり

第2類医薬品

新第一赤玉はら薬

特徴

新第一赤玉はら薬は、下痢止めや整腸薬として使用されているセンブリ末、ゲンノショウコ末など4種類の和漢生薬に、下痢でお腹が痛い時に効果のあるロートエキス散を配合した下痢止め薬です。下痢、食あたり、腹痛を伴う下痢等に効果をあらわします。

！ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. **本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください**
胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬
2. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**
(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
3. **授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください**
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

🗨️ 相談すること

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
 - (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6) 次の症状のある人。 排尿困難
 - (7) 次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障
2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. **服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**
口のかわき、目のかすみ
4. **5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

裏面もよくご覧ください。

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

用法・用量

次の1回量を、1日3回を限度として服用してください。
服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人（15才以上）	18丸（1包）	3回
11才以上15才未満	12丸	
8才以上11才未満	9丸	
5才以上 8才未満	6丸	
5才未満	服用しないでください	

用法・用量に関連する注意

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

新第一赤玉はら薬は、1日量54丸中に次の成分を含んでいます。

成 分	54丸中	成 分	54丸中
オウバク末	720mg	センブリ末	30mg
オウレン末	150mg	ロートエキス散	300mg
ゲンノショウコ末	480mg	(ロートエキス)	30mg

添加物として、バレイショデンプン、デヒドロ酢酸Na、乳糖水和物、寒梅粉、アラビアゴム、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、ゼラチン、赤色102号及び黄色5号を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は、服用しないでください。

問い合わせ先(お客様相談係)

電話番号：076-431-8863 [テイカ製薬(株)]
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元  大昭製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町大原市場168番地
製造販売元  テイカ製薬株式会社
富山市荒川一丁目3番27号