

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

止瀉薬

本草正露丸糖衣

食べ過ぎ、飲み過ぎ、冷えなどや、とくに夏場にみられるように胃腸機能が低下しますと、とかく下痢を起こします。こんなときに、**本草正露丸糖衣**を服用してください。

本草正露丸糖衣はクレオソートに生薬ゲンノショウコ末、オウバクエキスを配合した服用しやすい糖衣錠です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
(3) 高齢者。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合

効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量

次の量を1日3回を限度とし服用すること。

服用間隔は4時間以上おくこと。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	4錠	3回を限度
11歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上11歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

12錠(大人の1日最大服用量)中、次の成分を含有する。

成分	12錠中	主な作用
日本薬局方 クレオソート	276mg	殺菌作用
日本薬局方 ゲンノショウコ末	322mg	整腸作用
オウバク乾燥エキス (原生薬換算量)	322mg (1,932mg)	健胃作用

添加物として、アラビアゴム、プルラン、セルロース、バレイショデンプン、乳糖、CMC-Ca、二酸化ケイ素、白糖、ゼラチン、タルク、炭酸Ca、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、酸化チタン、セラック、ヒマシ油、カルナウバロウ、サラシミツロウを含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限をすぎたものは服用しないこと。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目6番21号

電話：052-951-0611（代表）

受付時間：月～金曜日 9:00～17:00（土、日、祝祭日を除く）

（裏面もお読み下さい）

2L050A



本草製薬株式会社

名古屋市中区古川町125番地