【粉末】

第②類医薬品

◆ウチダの和漢生薬◆

ウチダの センナ末

日本薬局方　センナ末

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり，副作用が起こりやすくなる）

1.本剤を服用している間は，次の医薬品を服用しないこと
　他の瀉下薬(下剤)
2.授乳中の人は本剤を服用しないか,本剤を服用する場合は授乳を避けること
3.大量に服用しないこと

相談すること

1．次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1)医師の治療を受けている人.
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人.
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人.
(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人.
(5)次の症状のある人.
　はげしい腹痛,悪心･嘔吐
2．次の場合は，直ちに服用を中止し，この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1)服用後，次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤，かゆみ
消化器	はげしい腹痛，悪心・嘔吐

(2)１週間位服用しても症状がよくならない場合
3.次の症状があらわれることがあるので，このような症状の継続又は増強が見られた場合には,服用を中止し,医師又は薬剤師に相談すること
　下痢

効能・効果

便秘　便秘に伴う次の症状の緩和：頭重,のぼせ,肌あれ,吹出物,食欲不振(食欲減退),腹部膨満,腸内異常醗酵,痔.

用法・用量

年齢	１日量
大人（15才以上）	１回 0.375～0.75ｇをなるべく就寝前に服用する．ただし初回は最小量を用い，便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量する．
15才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

・添付のサジ１杯が約 0.375g です.
・定められた用法・用量を厳守すること.

成分・分量

１日量（0.75ｇ）中
日本薬局方センナ末　　0.75ｇ

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること.
(2)小児の手の届かない所に保管すること.
(3)他の容器に入れ替えないこと.（誤用の原因になったり品質が変わる.）

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは，お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます.
株式会社　ウチダ和漢薬　０３－３８０６－４１４１
受付時間　9：00～17：30（土，日，祝日を除く）

副作用被害救済制度の問合せ先
（独）医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

VTF

株式会社 ウチダ和漢薬
東京都中央区日本橋本町 4-2-8