

ウチダのセンナ末 70g



第②類医薬品

ウチダのセンナ末 70g

日本薬局方 センナ末

MTA

用法・用量
 大人(15才以上)は1日1回0.375~0.75gをなるべく就寝前に服用する。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量する。

用法・用量に関連する注意
 ・添付のサジ1杯が約0.375gです。・定められた用法・用量を厳守すること。

効能・効果 便秘 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、軟便、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔。

使用上の注意

してはいけないこと
 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
 他の瀉下薬(下剤)
 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
 3. 大量に服用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 (1) 医師の治療を受けている人、(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人、
 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人、
 (4) 次の症状のある人、はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 下痢

4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意
 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
 (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

＜お問合せ先＞お客様相談センター
 株式会社ウチダ和漢薬 電話 03-3306-4141 副作用被害救済制度 電話 0120-149-031
 受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

スプーン袋: PE
 内 袋: PP

第②類医薬品

ウチダの

センナ末

便秘、便秘に伴う症状の緩和

頭重・のぼせ・肌あれ・腹部膨満

300g

第②類医薬品

ウチダの

センナ末

日本薬局方センナ末

成分・分量
1日量(0.75g) 中
日本薬局方センナ末0.75g

用法・用量
大人(15才以上)は1日1回0.375～0.75gをなるべく就寝前に服用する。ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量する。

用法・用量に関連する注意
・添付のサジ1杯が約0.375gです。
・定められた用法・用量を厳守すること。

効能・効果
便秘
便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔。

使用期限：

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931



4 987359 651014

紙箱

内袋

スプーン装

NMK

第②類医薬品

ウチダの

センナ末

便秘、便秘に伴う症状の緩和

頭重・のぼせ・肌あれ・腹部膨満

300g

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の瀉下薬（下剤）
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
3. 大量に服用しないこと

⚠ 相談すること
1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
4. 1週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱い上の注意
(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
(2) 小児の手の届かない所に保管すること。
(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

株式会社ウチダ和漢薬
新潟県上越市大潟区畑ヶ池 1755-3
<https://www.uchidawakanyaku.co.jp/>
〈お問合せ先〉お客様相談センター
電 話 03-3806-4141
受付時間 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)