

第3類医薬品

# 日本薬局方 ジュウヤク トチモトのジュウヤクP 十薬(日本産・寸切)

製造番号  
使用期限

## 【使用上の注意】

**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)  
本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の瀉下薬(下剤)

## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。  
はげしい腹痛、吐き気・嘔吐
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 1ヵ月位(便秘、便秘に伴う吹出物に服用する場合は5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚(ひふ)	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

【効能・効果】 便秘、尿量減少、便秘に伴う吹出物

【用法・用量】 大人(15歳以上)は1日量12gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服してください。  
・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管してください。

株式会社 **橋本天彦堂**

【脱酸素剤入り】   
副作用被害救済制度

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730

☎ 0120-149-931