

大晃生薬有限会社

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号

【用法及び用量】

大人（15歳以上）は1日1回0.375～0.75g
をなるべく就寝前に服用する。ただし初回は最小量を用
い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増量又は減量
する。

【効能又は効果】

便秘、便秘に伴う次の症状の緩和：頭痛、のぼせ、肌あ
れ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異
常発酵、痔

（裏面の「使用上の注意」などもよくお読みください。）

日本薬局方

医薬品

セ　ン　ナ　末

SENNAE FOLIUM PULVERATUM

内 容 量　500g

LOT. No



4 987716 137151

保管及び取扱い上の注意

- (1)本品は吸湿してカビが生じたり虫がつく事がありますので、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。…他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (5) 次の症状のある人…はげしい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。…下痢

— 保管及び取扱い上の注意 —

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になります。)
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。